

**Tabla 1. Estudios publicados de cribado de cáncer de mama con RM en pacientes de alto riesgo hereditario**

	año	estudio	Pacs.	CM detectados	%	CM Interv	% CDIS	% T < 1 cm	% N+	BI-RADS +	SENS MX	ESP MX	SENS RM	ESP RM	SENS MX+RM	ESP MX+RM
KRIEGE	2004	MRISC	1909	51	2,6	4	12	38	14	0,3,4 o 5	40	95	71	90	89	-
LEACH	2005	MARIBS	649	20	3,0	2	17	37	17	0,3,4 o 5	40	93	77	81	94	77
KUHL	2005	Unicentro	529	43	8,1	3	23	29	16	4 o 5	32	97	91	97	93	96
LEHMAN	2005	IBMC	367	4	1,0	-	25	33	0	4 o 5	25	98	100	79	100	73
SARDANELLI	2007	HIBCIRT	278	11	4,0	0	22	44	21	4 o 5	59	99	94	98	100	-
LEHMAN	2007	IBMC	171	6	3,9	-	0	67	20	3,4 o 5	33	91	100	79	100	73
HAGEN	2007	NIBGSG	867	25	2,9	5	12	44	26	3,4 o 5	32	-	68	-	80	-
KUHL	2010	EVA	687	27	3,9	0	41	56	11	4 o 5	33	99	92	98	100	97

En la columna 11 (BIRADS +) se detallan qué categorías BI-RADS se consideraban hallazgos positivos en RM. Pacs = Pacientes. CM = Cánceres de Mama. Interv = Intervalo. SENS = Sensibilidad. ESP = Especificidad.